

Tisztelt Olvasóink!

Az első negyedévben olvashatták a burgonya két legfontosabb termesztéstechnológiáját, most a Magyarországon dolgozó fajtatulajdonosok, fajtaképviselők, nemesítők által ajánlott fajták használati értékeit, leírását, valamint az egyes nemesítők, cégek elérhetőségét, a vetőburgonyával kapcsolatos tájékozódásukat szeretnénk segíteni. Honlapunkon (www.obtt.hu) a többi fajta leírását is megtalálhatják és a többi fajta képviselőjét, elérhetőségét is megismerhetik.

Idei két füzetünk alapján már jövőre eldönthetik, milyen ökológiai körülmények között, milyen technológia alkalmazásával, milyen fajtát érdemes termesztetni.

Olvassák honlapunkat, folyamatosan frissülő, hasznos információkat találhatnak ott.

Tisztelettel

a Szerkesztő

Tartalomjegyzék

AGRICO Magyarország Kereskedelmi Kft. 1027 Budapest, Bem rkp. 30. I/7.	2
Bács Gazda Coop Kft. 6400 Kiskunhalas Harangos tér 9.	9
Bédalin Kft. 1028 Budapest, Bujdosó köz 11.	13
DE AGTC KIT Nyíregyházi Kutatóintézet 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4-6.	19
Euro-Sol Kft. 1203 Budapest, Vizisport u. 21/A., IV. 2/A.	22
KRUPPA-MAG Kft. Dr. Kruppa József 4600 Kisvárd, Váralja út 22.	25
Osváth Zoltán 3925 Prügy, Csokonai V. M. u. 39.	26
Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Burgonyakutatói Központ 8360 Keszthely Deák Ferenc u. 16..	27
Wendler István Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 2. II. em. 14/B. Levélcím: 1398 Budapest, 62 Pf.: 586	32



Burgonyatermesztés

A gyakorló burgonyatermesztők részére

Szerkeszti és kiadja az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács

Cím: 1054 Budapest
Akadémia utca 1.
Telefon/Fax: (06-1) 269-0589
Email cím: obtt@t-online.hu

Nyomdai előkészítés:

Zászlónk Stúdió
Igazgató: Varga Péter
Címe: 2081 Piliscsaba, Vasút utca 5.
Telefon/Fax: 06-26-373-597
E-mail: zaszlonsk@mail.datanet.hu

Nyomda: Virtuóz Kft.
Címe: 1035 Budapest, Bécsi út 267.

A kiadvány tartalmával a Szerkesztőbizottság véleménye nem minden esetben egyezik, az abban foglaltakért a fajtatulajdonosok vállalják a felelősséget

Kéziratokat nem őrünk meg
és nem küldünk vissza.

Azonosító szám:
ISSN 1785-2382

**HA IMPORT VETŐBURGONYA,
AKKOR CSAK A HOLLAND**



szövetkezet fajtáiból

**KONDOR • AGRIA • IMPALA
KURODA • AMOROSA • ALADIN
ROKO • FABIOLA • MANITOU
LUSA • EVOLUTION**

Agrico Magyarország Kereskedelmi Kft.
1027 Budapest, Bem rakpart 30.1/7. Telefon/fax: 201-4588, 214-7393
www.agrico.hu e-mail: info@agrico.hu

„Szállítunk az Önök megrendelésére és megelégedésére”

Kondor

A Kondor közép-késői érésű, piros héjú, világos sárga húsú étkezési burgonya. Gumója nagyméretű, hosszúkasán ovális, sekélyen ülő szemekkel. Viszonylag keveset köt de nagy termés elérésére képes. Nem szétfővő, kissé szappanos állagú gumóinak mérete kiegyenlített, szárazanyag tartalma alacsony. Régi kipróbált fajta, a világ minden piros héjú burgonyát termelő részén megtalálható.



Gumókötése és kezdeti fejlődése igen gyors. Ezért előhajtva primőr termesztésre is kiválóan alkalmas. A fajtára jellemző nagy méreteit csak később éri el. A Kondor Y vírusra és lomb fitoftórára enyhén fogékony, gumó fitoftórának jól ellenáll. Erwiniára és varasodásra fogékony, a burgonyarákkal szemben immunis. Ültetéskor a tőtávolságot 32 cm-re állítsuk be, 35/55 mm és gumóméret esetén (40.000 tő/ha). A gumók teljesen beérett állapotában takarítsuk be a termést, hogy esetleges szürkülésüket elkerüljük. Nitrogén műtrágya igénye átlagos. A Kondor nyugalmi állapota hosszan tartó, 5° Celsiuson sokáig eláll minőségromlás nélkül.

Sencor alkalmazásakor előfordulhat enyhe levél sárgulás, de a termés mennyiségét nem érinti.

Agria



Az Agria közép-késői, burgonyafajta, kiválóan alkalmas friss piaci étkezési burgonya és hasáb burgonya céljára, de Dél-Európában chips készítésére is használják. Gumója enyhén lisztes állagú, nem szétfővő.

Az Agria gumói nagy méretűek, formájuk hosszúkasán ovális, héjuk sárga, húsuk mély sárga. A gumószám mérsékelt, szárazanyag tartalma magas. Egész Európában és a Közép-Keleten

is termesztik. Az Agria „bio” termesztésre kiválóan alkalmas.

A megfelelő gumószám elérése érdekében javasolt a hő-sokk, vagy előhajtás alkalmazása. Feldolgozási célra történő termesztés esetén 35/55 mm-es vetőgumó használatkor a tőtávolság legyen 32 cm (40.000 tő/ha). Ugyan ez étkezési célú termesztéskor 27 cm (50.000 tő/ha). Folyamatos öntözés ajánlott könnyű talajok esetén a varasodás elkerülése érdekében. Az Agria lomb fejlődése kezdetben lassú, de a tenyészidő során nagy erős lombozatot növeszt. Nitrogénből az átlagosnál kisebb adag javasolt a megfelelő szárazanyag tartalom elérése érdekében. Betakarítás után a gumók feltétlenül szárazon kerüljenek a tárolóba. Csírázás gátló csak sérülés-mentes, száraz gumókra vihető fel. Az Agria nyugalmi ideje nagyon hosszú. 6° Celsiuson tárolva jó minőségben eláll a következő év április-májusáig. Az Agria varasodásra enyhén, erwiniára jobban fogékony. Lomb fitoftórával szemben kissé-, gumó fitoftórával szemben jól ellenáll. Y, X és A vírusokkal szemben rezisztens csak úgy, mint a fonálféreg Ro1 és 4 rassaival szemben. Fuzáriumra enyhén fogékony.

Sencor használatára a levelek enyhén elszíneződhetnek és mérsékelt termés csökkenés is előállhat.

Impala

Az Impala igen korai, primőr termesztésre is kiválóan alkalmas, sárga héjú, világos sárga húsú étkezési burgonyafajta. Gumója hosszú-kásán ovális, közepes, de egyöntetű méretű, nagyon sekélyen ülő szemekkel.

Nem szétfővő, szárazanyag tartalma alacsony. Nagy termés elérésére képes, kötés száma átlagos. Szép formája, sima héja különösen alkalmassá teszi mosott-csomagolt formában történő értékesítésre. A hámozó üzemeknek is kedvelt fatája.

Az Impala gyors kezdeti fejlődésű fajta, gumókötése igen korai. Előhajtatással koraisága fokozottan érvényesíthető.

Műtrágya igénye átlagos dózissal kielégíthető. Koraisága ellenére nyugalmi állapota viszonylag hosszú, Megfelelő hőmérsékleten jól tárolható. Y vírussal szemben jól ellenáll, lomb fitoftórára fogékony. Varasodásra és gumó fitoftórára kissé érzékeny. Erwiniára fogékony. Rezisztens a burgonyarákkal és a fonálféreg Ro1 és 4 rasszaival szemben.



Sencor alkalmazása enyhe levél sárgulást okozhat. Betakarításkor mechanikai sérülésekre nem érzékeny, szürkülésre nem hajlamos.

Kuroda



A Kuroda közép-késői érésű, piros héjú, sárga húsú étkezési burgonya. Gumói közepes méretűek ovális formával, rajtuk a szemek sekélyen ülnek.

Nem szétfővő, enyhén lisztes állaga sütésre különösen alkalmassá teszi.

Európa középső és déli részein, valamint Észak-Afrikában elterjedt. A Kondor fajtához hasonló, de annál több gumót köt kisebb és egyenletesebb méretben.

A megfelelő gumószám eléréséhez alkalmazzunk előhajtatást a csírák egyszeri eltávolítása után. Kerüljük a hűtött tárolóból történő közvetlen kiültetést. A tőtávolság 35/55 mm-es gumóméret esetén 32 cm legyen (40.000 tő/ha). A Kuroda kezdeti fejlődése igen gyors. Lombozata dús, jó takarást biztosító erős levelekkel. Kiegyenlített termesztési körülményeket igényel. Ha betakarításkor a gumók nem kellően érettek, szürkülés előfordulhat.

Nitrogén műtrágya adagja az átlagosnál nagyobb legyen. A tenyészidő során alkalmazott N fejtrágyázással a gumószám növelhető. Nyugalmi ideje hosszú. Tárolhatósága 5° Celsiuson kiváló. A Kuroda enyhén fogékony X vírusra, lomb- és gumó fitoftórára. Rezisztenciát mutat A és Y vírusra, burgonyarákra, valamint a fonálféreg Ro1 és 4 rasszára.

Sencor használata nem javasolt az általa okozott levél sárgulás és kisebb termés miatt.

Amorosa

Az Amorosa korai érésű, szép piros héjú, világos sárga húsu étkezési burgonya.

Nagy méretű, hosszúkasan ovális gumóin a szemek sekélyen ülnek.

Termőképesége átlagon felüli.

Nem szétfővő, közepes szárazanyag tartalmú fajta.

Gumóit korán köti viszonylag kis számban, ezért azok nagyra nőnek.

A legtöbb talajtípuson jól termeszthető. A tenyészidő során kiegyenlített vízellátást igényel. Egyszerre nagy mennyiségű csapadék vagy túllöntözés miatti hirtelen növekedés gumórepedést okozhat.

Előcsíráztatás nem szükséges, kezdeti fejlődése igen gyors. Primőr piacra történő termesztéskor viszont alkalmazható. Ültetéskor 35/55 mm-es vetőgumó méret esetén a tőtávolság 32 cm legyen (40.000 tő/ha).

Nagyméretű gumói miatt a megfelelő talajborítás fontos. Nyugalmi ideje viszonylag rövid ezért hosszantartó tárolásra nem számíthatunk. Primőr célú termesztésnél ez a tényező nem probléma.

Nitrogén műtrágya adagja az átlagosnál kisebb legyen. A tenyészidő során alkalmazott N fejtrágyázással a gumószám növelhető. Az Amorosa varasodásra és lomb fitoftórára hajlamos, Y vírussal és gumó fitoftórával szemben jól ellenáll. Rezisztens a fonálféreg Ro1 és 4 rassaival szemben.

Sencor alkalmazásakor a levelek enyhén sárgulhatnak és a termés kissé csökkenhet. Korán kifejlődő dús lombja jó talajtakarást biztosít. Nem kellően beérett gumóknál szürkülés előfordulhat.



Aladin



Az Aladin közép-késői érésű, kiváló termőképeségű, feltűnően szép piros héjú étkezési fajta. Gumója ovális, rajta a szemek sekélyen ülnek, húsa krém sárga. Kötésszáma kiemelkedően magas. Nem szétfővő, kissé szappanos állagú, szárazanyag tartalma magas. Európa középső és déli részein jól termeszthető.

A tárolóból történő közvetlen kiültetés sem okoz gondot, de jobb megvárni, míg a szemek nyílni kezdenek. A csírák egymás után többszöri eltávolítása negatív hatással lehet a kötésszáma. A stólok hossza mérsékelte, vetőgumóit ajánlatos az átlagosnál mélyebbre ültetni. A tőtávolság 35/55 mm-es gumóméret esetén 32 cm körül legyen (40.000 tő/ha). Korán kifejlődő lombzatát erőteljes levelek alkotják. Talajtakarása annak ellenére kiváló, hogy a szárok kissé szétállnak.

Nitrogén műtrágyából átlagos dózist igényel. Az Aladin nyugalmi ideje hosszú. Meglehetősen jól tárolható 6° Celsius körüli hőmérsékleten. Étkezési burgonya esetén csírázás gátló alkalmazható. Az Aladin burgonyarák ellen rezisztens, de fogékony a fonálféreg Ro1 rasszára. Enyhén fogékony a sugárgombás varasodásra és az erwiniára. Rezisztens Y vírusra és poros varasodásra, de kissé fogékony gumó fitoftórára.

Sencor használata nem okoz problémát. Ha a gumók megfelelően érettek a szürkülés minimális mértékű.

Roko

A Roko közép-korai, nagyon szép piros héjú, fehér húsú étkezési fajta. Ovális formájú gumói meglehetősen nagyra nőnek, rajtuk a szemek sekélyen ülnek, méretük kiegyenlített.

Kiváló termőképesség jellemzi.

A gumók állaga enyhén lisztes, de nem szétfővő, szárazanyag tartalma viszonylag magas, sütésre különösen alkalmas. A Roko minden talajtípuson sikerrel termeszthető Európában és

Ázsiában egyaránt. Egy hő-sokk utáni előcsíráztatás javasolt. A tőtávolság 35/55 mm-es gumóméret esetén kb. 32 cm legyen (40.000 tő/ha). A Roko lombját viszonylag lassan, de nagyra növeszti. Lombozata erős, a talajt jól takarja. Nitrogén műtrágyából az átlagosnál kicsivel több ajánlott. Extra adag kálium kijuttatásával a szürkületi hajlam kiküszöbölhető.



Nyugalmi állapota hosszú, ezért jól tárolható hosszabb távon is. A Roko varasodásra és lomb fitoftórára kissé fogékony. Fuzáriumnak és gumó fitoftórának jól ellenáll. Y vírussal és burgonyarákkal szemben rezisztens csak úgy mint a fonálféreg Ro1 és 4 rassaival.

Fabiola



A Fabiola közép-késői érésű, nagyon szép, élénk piros héjú, krém sárga húsú étkezési burgonya. Gumója hosszúkán ovális, héja sima, szemei sekélyen ülnek. Piacos külleme miatt mosva-csomagolva jól értékesíthető. Magas kötésszám, kiegyenlített, közepes nagyságú gumóméret jellemzi. Nem szétfővő, átlagos szárazanyag tartalmú fajta. Étkezési tulajdonságai kifejezetten jók. Minden típusú talajon termeszthető, ha a vetőágy előkészítése kellő gondossággal történik.

Ültetés előtt előhajtás javasolt, mert különben előfordulhat, hogy a csírázás és a kelés vontatottan, egyenetlenül indul. A tenyészidő során ez kiegyenlítődik. Lehetőleg csak kellően felmelegedett talajba ültessük. Hideg talajban tovább elfekszik. A tőtávolság 35/55 mm-es vetőgumó méret

esetén 32 cm legyen (40.000 tő/ha). Kellően beérett állapotban betakarításkor a mechanikai sérülésekre nem érzékeny. Hosszú ideig jól tárolható, ha a szántóföldi növényvédelme megfelelő.

Nitrogén műtrágyából 150 kg/ha kijuttatása ajánlott, egyéb műtrágyák esetén átlagos dózist alkalmazunk. A Fabiola Y vírusnak jól-, levélsodróknak közepesen ellenáll. Varasodásra enyhén hajlamos. Lomb fitoftórára közepesen, gumó fitoftórára kevésbé érzékeny. Rezisztens a burgonya rákkal és a fonálféreg Ro1 és 4 rassaival szemben.

Sencor használata nem okoz elváltozást a levélzeten, és a termésre sincs kedvezőtlen hatással.

Manitou

A Manitou közép-késői, friss piacra való, piros héjú, világos sárga húsú étkezési burgonyafajta. A hosszúkásan ovális nagyméretű gumókon a szemek sekélyen ülnek. Átlagos kötésszám és kiegyenlített gumóméret jellemzi.

Száranyag tartalma viszonylag magas, nem szétfővő típus.

Étkezési értéke kifejezetten jó, hasáb

burgonya céljára különösen alkalmas. A Manitou a legtöbb talajtípuson jól termeszthető a hagyományosan piros héjú fajtákat használó területeken kedvelt. A Desirée javított változatának tekinthetjük.

A megfelelő kötésszám elérése érdekében ajánlott az előcsíráztatás. A hűtött tárolóból történő közvetlen kiültetés nem javasolt. A csírák egynél többször történő eltávolítása a kötések számát negatívan befolyásolja. 35/55 mm-es gumóméret esetén a tőtávolság 35 cm legyen (40.000 tő/ha).

Fontos a megfelelő bakhát kialakítása!

Lombozata erőteljes, gyors fejlődésű, ezért talajtakarása kiváló. Szártalanítás után felszedésig 3 hét szükséges a megfelelő parásodás eléréséhez. Nitrogén műtrágyából az átlagosnak megfelelő dózis alkalmazása ajánlott. Nyugalmi állapota viszonylag hosszú, ezért jól tárolható 5°C-on.

Lomb fitoftórára kissé fogékony, Y vírussal és gumó fitoftórával szembeni rezisztencia tulajdonságai kifejezetten jók. Varasodásra enyhén hajlamos. Fonálféreg Ro1, 3 és 4 rassaival szemben rezisztens.

Sencor alkalmazása nem megengedett!



Lusa



A Lusa közép-késői piros héjú, sárga húsú étkezési fajta. Ovális gumói nagyra nőnek kifejezetten szép piros héj és sekélyen ülő szemek a jellemzői. Kötésszáma átlagos kiegyenlített mérettel. Nagy termés elérésére alkalmas. Nem szétfővő átlagos száranyag-tartalommal.

Étkezési tulajdonságai kiválóak.

A legtöbb talajtípuson termeszthető, bár varasodásra kissé hajlamos.

A hűtött tárolóból közvetlenül kiül-

tethető egy hő-sokk alkalmazása után. Előhajtatással kezdeti fejlődése gyorsítható. A csírák egynél többszöri eltávolítása termés-csökkenést okozhat. A tőtávolság 35/55 mm-es vetőgumók esetén 32 cm legyen (40.000 tő/ha). Ügyeljünk a bakhátak megfelelő kialakítására. Lombozata gyorsan nagyra nő, talaj takarása jó. A szártalanítást követően 3 hét szükséges a megfelelő parásodásra. Csak ezt követően kezdjük a betakarítást.

Nitrogén műtrágya igénye átlagos. Viszonylag rövid nyugalmi állapota ellenére közepesen hosszú ideig tárolható. A Lusa varasodásra enyhén hajlamos, Y vírusra kissé fogékony. Rezisztenciát mutat burgonyarákkal és fonálféreggel szemben.

Sencor alkalmazásakor a lomb elszíneződhet, de a termés mennyisége nem változik negatívan.

Evolution

Az Evolution nagyon korai, élénk piros héjú, világos sárga húsú étkezési fajta. Nagy méretű gumói hosszukásan oválisak melyeken a szemek sekélyen ülnek. Gyors kezdeti fejlődésének köszönhetően korán beérő nagy terméshozam jellemzi. Nem szétfővő viszonylag alacsony szárazanyag tartalmú.

Az Evolution a lazább szerkezetű talajokat kedveli. Egyenletes vízellátás szükséges az egyöntetű termés eléréséhez.

Primőr termesztésre különösen alkalmas Kelet-Európa és a Mediterrán országok területén.



Előcsíráztatás nem feltétlenül szükséges, de egy rövid hő-sokk alkalmazása ajánlatos. 35/55 mm-es gumóméret esetén az ajánlott tőtávolság 30 cm (45.000 tő/ha). Korai gyors fejlődése révén lombja hamar biztosít jó takarást. Szürkülésre nem hajlamos. Nitrogén műtrágyából az átlagosnál kevesebbet igényel. Mivel nagyon korai fajta, nyugalmi állapota viszonylag rövid. Hosszantartó tárolásra nem alkalmas.

Gumó fitoftórára kissé fogékony. Varasodásra nem hajlamos. Fonálféreg Ro1 és 4 rassaival szemben rezisztens.

Sencor alkalmazása a levelek enyhe sárgulását okozhatja, de termés csökkenéssel nem jár.

Burgonyalángos

Nyolc közepes burgonyát meghámozunk, majd lereszeljük. Összekeverünk 2 dl lisztet 5 dl tejjel és 2 tojással. Sózzuk, borsozzuk és hozzáadjuk a reszelt burgonyát. Serpenyőben olajat melegítünk, majd a burgonyás masszából egy-egy merőkanálnyit beleteszünk, elegyengetjük, mint egy vastagabb palacsintát és mindkét oldalán pirosra sütjük.

Sült sonkával vagy szalonnával, vagy tükörtojással és káposztasalátával tálaljuk.

Burgonyás palacsinta

Palacsintatésztát készítünk fél liter tejből, 1 tojásból, 20 dkg lisztből, 3 db főtt, áttört burgonyával, pici sóval. Palacsintákat készítünk belőle, melyeket kikent, tűzálló táliba fektetünk úgy, hogy mindegyiket meglocsoljuk tejföllel és meghintjük reszelt sajttal. Tetejére tejfölt teszünk és sütőben pirosra sütjük.

Tortaként lehet szeletelni, köretként, vagy párolt zöldségféle körettel, de önmagában is nagyon finom étel.



**Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**

6400 Kiskunhalas, Harangos tér 9. Pf. 70

Tel./Fax: 06-77/429-433, 06-77/420-186

Mobil.: 30/56-72-306

E-mail: bacsgazda@t-online.hu

Honlap: www.gazdacoop.hu

Minőségi vetőburgonya – 15 éve a partnereink szolgálatában!

Vetőburgonya ajánlatunk

Frieslander

Barna

Blaue St Galler

Romeo

Red Sun

Solist

Aktiva

További információ, vetőburgonya beszerzés:

Bács Gazda-Coop Kft

6400 Kiskunhalas, Harangos tér 9.

Nagyker raktár:

6400 Kiskunhalas, Tinódi u. 19.

Skype: [kelemen.gabor.bacsgazdacoopkft](https://www.skype.com/name/kelemen.gabor.bacsgazdacoopkft)

Honlap: www.gazdacoop.hu

VETŐBURGONYA-VETŐMAG-MŰTRÁGYA-NÖVÉNYVÉDŐSZER



Frieslander

Érésidő: Rendkívül korai, nagyon korai gumóképződéssel.

Gumó: Hosszúkás ovális, szabályos forma, sekély szemek, darabos méret. A gyors, korai növekedésnek köszönhetően jó minőségű gumók, magas terméshozam nagyon rövid idő alatt.

A gumó mérete közepes-nagy.

Hússzín: sárga.

Héjszín: sárga.

Felhasználás: Kimondottan finom ízű, sütésre – főzésre egyaránt kiválóan alkalmas. Főzés után nem színeződik el.

Előnyök: Nem hajlamos a babásodásra, a torz gumók képzésére. Jól tűri a gépi betakarítást és a manipulációt. A levelek fitoftórával szembeni ellenálló képessége közepes, a gumó fitoftórával szembeni ellenállása jó. Szárazságtűrése jó.

Az egyik legfinomabb burgonyafajta!

Főzési típus: **B.**

Metribuzin (Sencor 70 WG, Metripaz 70 WG) hatóanyaggal szemben érzékeny.



Barna



Érésidő: középérésű.

Gumó: Ovális – hosszúkás ovális, nagy méretű gumók sekélyen ülő szemekkel.

Hússzín: fehér.

Héjszín: piros.

Felhasználás: Általános étkezési felhasználásra kiváló.

Előnyök: Nagy hozamú fajta, nagyon jól tárolható. Jól ellenáll a vírusoknak, gumó és lomb fitoftórának, varasodásnak és a feketelábúságnak is. Egyik szülője a Desiree – ezért nagyon hasonlít hozzá, de egy jóval ellenállóbb fajta.

Főzési típus: **B.**

Krumplis melegszendvics

Fél kg lisztet, negyed kg margarint és 40 dkg főtt krumplit, 1,5 dkg felfuttatott élesztőt és egy teáskanál sót összekeverünk, és cipót képezünk. Így cipó formában másfél órát kelesztjük, majd ujjnyi vastagra nyújtjuk, a legnagyobb pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, s a tetejét tojással megkenjük. Így is hagyjuk még kelni, majd előmelegített sütőben megsütjük.



BURGONYA FAJTÁK

Blaue St Galler

Egy igazi különlegesség!

A Blaue St Galler sötétlila héjú és lila hú-
sú burgonya.

Különleges íz és színhatás a burgonyás
ételekhez.

Konyhai különlegességekhez,
sütve vagy főzve.

Középkorai érésű.

Főzési típus: A/B.



Romeo



Érésidő: középérésű.

Gumó: Különösen szép küllemű, ovális, rendkívül sima felszínű, mélypiros színű, piacos gumókat terem.

Hússzín: fehér.

Héjszín: piros.

Felhasználás: nagyon jó étkezési minőséggel bír. Magas szárazanyag tartalma révén kiválóan alkalmas sütésre, pürésítésre és chips készítésre egyaránt.

Előnyök: nagy hozamú, különösen szép küllemű piacos fajta.

Jó rezisztenciát mutat a lomb fitoftórával,

a fómás gumókorhadással, a rhizoctoniával szemben. Nem érzékeny a mechanikai sérülésekre sem.

Főzési típus: B/C.

Red Sun

Érésidő: középkorai.

Gumó: ovális, sima felszínű, egységes méretű, piacos gumók.

Hússzín: sárga.

Héjszín: piros – színét tárolás során is jól megőrzi.

Felhasználás: Nagyon jó ízű, jó étkezési minőségű. Szárazanyag tartalma átlagos, általános konyhai felhasználásra – sütésre, főzésre egyaránt – alkalmas.

Előnyök: Jól tárolható, szép küllemű fajta. Jól ellenálló a fonalférgekkel (Ro 1,4,5) szemben. Mechanikai sérülésekre nem érzékeny, a gépi betakarítást és feldolgozást jól tűri. A fajta nagyon jól alkalmazkodó – a mediterrán országoktól kezdve Európa északnyugati részéig egyaránt sikerrel termesztik. Hőstresszre nem érzékeny, jól tűri a forró éghajlatot is.

Főzési típus: B.





Solist

Érésidő: igen korai- Európa egyik legkorábbi fajtája.

Gumó: kerek-ovális formájú, sekélyen ülő szemekkel.


Hússzín: sárga.

Héjszín: sárga.


Felhasználás: általános konyhai felhasználásra alkalmas, piacos fajta.

Előnyök: Igen korán nagy hozamra képes, hajtatasra kiválóan alkalmas. Jól tárolható, hosszú nyugalmi idővel. Nagyon jól ellenáll a levélsodró vírussal és a fonalférgekkel(Ro1, Ro4) valamint a lombfitoftórával és a varasodással szemben.

Főzési típus: **B.**



Aktiva



Érésidő: korai.

Gumó: hosszúkás-ovális formájú, egységes, nagy méretű gumók.

Hússzín: sárga.

Héjszín: sárga.

Felhasználás: jó ízű fajta, általános konyhai felhasználáson túl, hasáburgonya és dehidratált termékek előállítására is kiválóan alkalmas.

Előnyök: nagyméretű gumók révén nagy hozamra képes. Jól tűri a forró éghajlatot, hő stresszt. Fizikai sérülésekre nem érzékeny, hosszú nyugalmi idejű, jól tárolható fajta. Nagyon jól ellenáll a rizoktóniával és a feketelábúsággal szemben. Jól ellenáll a fonalférgeknek(Ro1, Ro4).

Főzési típus: **B.**

Tepsis tejfölös burgonya

A burgonyát meghámozzuk, karikákra vágjuk, tepsibe tesszük, jól befűszerezzük sóval, borssal, vegetával, kevés sertésszírral, vagy olajjal sütőben megsütjük (kb.: 220 Co-on). Fontos, hogy alaposan meg legyen fűszerezve! Amikor teljesen megpuhult a burgonya, akkor tejföllel bekavarjuk és a sütőbe visszarakva pirosra sütjük.

1 kg burgonyához lehet 2 dl tejfölt számolni. Az így elkészített burgonya melegen is fogyasztható, de néhány óra múlva hidegen is nagyon finom.



VETŐBURGONYA AJÁNLATUNK:

NAGYON KORAI ★ KORAI ÉRÉSCSOPORT

Luminella

Arosa

Rosara

Marine

Labella

Cherie

Red Lady

Amandine

Natascha

KÖZÉP-KORAI ÉRÉSCSOPORT

Dalida

Red Magic

Pamela

Tiamo

Stemster

Maestro

Charlotte

További információk és megrendelés:

BÉDALIN Kft.

1028 Budapest, Bujdosó köz 11.

Telefon: +36 1 274 7256

Fax: +36 1 391 6026

Mobil: +36 30 9567 437

E-mail: bedalin@burgonya.hu Honlap: www.burgonya.hu



BURGONYA FAJTÁK

Dalida

Középkorai-érésű burgonyafajta. A gumó kerek-ovális, szabályos, sekély rügyek.

Hússzín világos sárga.

Héjszín mély piros.

Főzési típusa **B**, túlnyomóan nem szétfővő. Értékesítése mosott, kiserelt burgonyaként különösen ajánlott.

Betegség ellenállóság: burgonyavésszel szemben a lombon jó, a gumón magas. Varasodással szemben jó.

Fonálféreg ellenálló – relatív szárazságtűrő – magas termésátlag és betegség ellenállóság.



Red Magic



Középkorai-érésű burgonyafajta.

A gumó kerek-ovális.

Hússzín fehér.

Héjszín mély piros.

Főzési típusa **B**, nem szétfővő.

Piaci igényeinknek megfelelő héjszíne, tetszetős formája, sima héja és a sekély szemek miatt nagyon piacos megjelenésű.

Fonálféreg- és varasodás-ellenálló – jól tárolható – nagyobb foszfor igénye miatt istállótrágyát vagy magasabb dózisu foszfor műtrágyát igényel.

Pamela

Középkorai-érésű burgonyafajta.

Gumója hosszúkás ovális, szabályos, sekély szemek, darabos méret.

Hússzín világos sárga.

Héjszín piros.

Főzési típus **A/B**, nem szétfővő. Kiegyenlített, közepes gumóméret (minimális veszteség a méret alatti és feletti tartományban). Jó alkalmazkodó képesség jellemzi szélsőséges viszonyok között is.

Csíra nyugalom viszonylag rövid.

Fonálféreg ellenálló – levélsodró vírus és gyűrűs nekrosis ellenálló – közepes ellenállóság jellemzi a fitoftóra, a barnarothadás és az Y vírusra.



Cherie

Korai érésű burgonyafajta.

Gumója hosszúkás, kifli jellegű.

Hússzín világos sárga.

Héjszín élénk piros.

Főzési típus A, salátának való.

Tetszetős formája, sima héja és a sekély fekvésű szemek miatt nagyon piacos megjelenésű. Rendkívül bőtermő – nagy termésbiztonság – kiváló íz – szép forma – megbízható minőség.

Konyhaművészeti kényeztetés francia módra!

Fonálféreg és varasodás ellenálló – nagyon biztonságosan tárolható – előhajtva, primőrként a piacok keresett terméke.



Labella



Korai érésű fajta. Gumója hosszúkás-ovális, igen sekély rügyek.

Hússzín világos sárga.

Héjszín piros.

Főzési típus A/B.

A növény közepesen magas, meglehetősen gyors növekedés, jó takarás. Nagyon biztonságosan tárolható. Termesztése leginkább homok ill. könnyű talajokba ajánlott. Kissé érzékeny Sencorra, maximálisan felhasználható mennyiség 500 g/ha.

A hálós héj megelőzése miatt csiragátló használata nem ajánlott. Előhajtva, primőrként a piacok keresett terméke.

Fonálféreg (Ro1) ellenálló, szárazságra, varasodásra kevésbé érzékeny; lombfitofitórára közepesen érzékeny; gumófitofitórára, A, Yn, X és levélsodró vírusra nagyon kevésbé érzékeny.

Luminella

Nagyon korai érésű burgonyafajta.

Gumója hosszúkás, sekély rügyek.

Hússzín világos sárga.

Héjszín piros.

Főzési típusa B/C.

Cleopatra mutans.

Előhajtva primőr burgonyaként értékesíthető.





BURGONYA FAJTÁK

Marine

Nagyon korai érésű fajta. Gumója ovális, sekély rügyek.

Hússzín világos sárga.

Héjszín sárga.


Főzési típusa A/B.

Korai felszedéssel azonnali fogyasztásra ajánlott fajta.

Fonálféreg ellenálló – nagy gumószám és darabos, kiegyenlített méret jellemzi – jó étkezési minőségű.



Arosa



Nagyon korai érésű burgonyafajta. Gumója ovális, szabályos forma, sima héj jellemzi.

Hússzín krém sárga.

Héjszín piros.

Főzési típus A/B.

Bőtermő, piacos, rendkívül ízletes, kiszerelésre különösen ajánlott, kiváló hasábburgonya alapanyag is.

Fonálféreg ellenálló (Ro1, Ro4, Ro5), feketelábúságra, gumórothadásra, vasfoltosságra, varasodásra szintén ellenálló.

Nagy gumószám és darabos, kiegyenlített méret – gyors kezdeti fejlődés, korai gumókötés jellemzi, érés-időben Cleopatrát követi.

Amandine

Korai érésű burgonyafajta. Gumója elegáns hosszúkas, egyenletes méret, magas gumószám, sima, csillogóan fényes héj jellemzi.

Hússzín világos sárga.

Héjszín sárga.

Főzési típusa A.

Kiemelkedően jó ízű francia burgonya – éttermi felhasználásra különösen ajánlott – igényes termelőnek – igényes fogyasztónak.

Lombfitoftórára nem érzékeny.



Red Lady



Korai érésű fajta. Gumója hosszúkas-ovális, formás, egészen sekély rügyek.

Hússzín sárga.

Héjszín piros.

Főzési típus A/B.

Alacsony a méret alatti gumók aránya – piacos megjelenés – bő termés jellemzi.

Fonálféreg (Ro1), lomb- és gumófitoftóra (!), vas-, és feketefoltosság, varasodás ellenálló.

Rosara

Nagyon korai érésű burgonya.

A gumó hosszúkas-ovális, sima héjú.

Hússzín sárga.

Héjszín piros.

Főzési típus **A/B**. Korai gumókötés, sekély szemek, sima héj. A termés és a minőség stabilizálására feltétlenül ajánlott az öntözés. Az érett gumókat nem szabad sokáig a talajban tárolni.

Sokféle felhasználhatóságú, bőtermő,

piacos, viszonylag robusztus gumók, rendkívül ízletes, kiszerelésre különösen ajánlott.

Fonálféreg ellenálló (Ro1), feketelábúság, gumórothadás, vasfoltosság, varasodás, Y vírus, levélsodró vírus (magas fokon) ellenálló.



Nafascha



Korai érésű fajta. Gumója szabályos, ovális.

Hússzín és a **héjszín** is sárga.

Főzési típusa **A/B**. Kiemelkedő terméshozamú burgonya.

Fonálféreg (R01, 4) ellenálló, magas fokú rezisztencia a rizoctónia, a feketelábúság, az Y vírus és a gumórothadás ellen.

Maestro

Közép korai érésű burgonyafajta.

Gumója hosszúkas.

Hússzín és a **héjszín** is sárga.

Főzési típus **B**, mint az Agria fajta esetében.

Agria keresztezésként kiváló étkezési/feldolgozási minőség, 21-22% közötti szárazanyag tartalom jellemzi. Sütési szín tárolás esetén is kiváló, jó a tárolhatósága, a csíranyugalom átlagos, üregesedésre nem hajlamos, Agriánál rövidebb érésidő, erős formai stabilitás jellemzi.

Fonálféreg (Ro1-4) ellenálló; Y vírusra kevésbé, PVYntn (gyűrűs nekrosis) nem érzékeny.

Magas szárazanyag tartalom – kiváló étkezési minőség – nagyon jó tárolhatóság





BURGONYA FAJTÁK

Stemster

Közép korai érésű fajta.
Gumója ovális, hosszúkas-ovális, kiegyenlített forma, darabos méret, magas gumószám, sekély szemek.


Hússzín világos sárga.

Héjszín világos piros.


Főzési típus **B**.

Fonálféreg ellenálló.
Elvárható ellenállóképesség.
Kisebb hajlam gumótorzulásra.
Mechanikai sérülésre nem érzékeny.

Desiree-ből nemesített, bőtermő skót burgonyafajta



Charlotte



Közép korai érésű burgonyafajta.
Gumója hosszúkas ovális, darabos.

A **hússzín** világos sárga, a **héj színe** sárga.

Főzési típusa **A**.

Sekély szemek, egyöntetű gumóméret, nagy kötésszám, bő termés jellemzi.
Saláták, hidegkonyhai készítmények és egyéb ínyencségek minőségi alapanyaga.

Fonálféreg ellenálló.

Igényes termelőknek és nagyigényű vendégeknek, éttermeknek!

Burgonyasaláta

A héjában megfőtt burgonyát vékony szeletekre vágva majonézzel jól összekeverjük, apróra vágott hámozott almát, apróra vágott uborkát és zöld színű paprikát (lehet egy kis rész csípős is!) szórunk bele, valamint egy tálra számítva egy jól feldarabolt főtt tojást is tehetünk. A tetejét petrezselyem-zölddel, főtt tojás szeletekkel, vagy paradicsommal is díszíthetjük.

Köretként, de önállóan is fogyasztható.



INTÉZETI BURGONYA FAJTÁINK

	REBEKA	BOGLÁRKA	RACHEL
Érésidő	korai	korai	középkorai
Tenyészdő /nap/	96-98	101-103	108-112
Termésmennyiség /t/ha/	35-38	35-38	35-40
Hússzín	világos sárga	világos sárga	fehér
Héjszín	rózsaszín	rózsa héjú	piros
Keményítő tartalom /%/	17-19	16-18	17-18
Levélsodródó vírus	rezisztens	rezisztens	toleráns
X-vírus	rezisztens		rezisztens
Y-vírus	rezisztens	rezisztens	rezisztens
Alternáriás levélfoltosság	közepesen érzékeny		kissé fogékony
Gumóbetegségek	rezisztens	mérsékelt rezisztens	nem fogékony
Sugárgombás varasodás	toleráns	mérsékelt rezisztens	toleráns
Étkezési és egyéb felhasználhatóság	sütve, főzve	B-főzési típusú; keményítőipari célra	sütve, főzve

Intézetünkben vírusmentesített vetőgumó előállítása folyik.

Elérhetőség:

Debreceni Egyetem AGTC KIT Nyíregyházi Kutatóintézet

4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4-6.

Telefon: 06/42/594-300

Fax: 06/42/430-009

E-mail cím: nykutato@agr.unideb.hu

Honlapcím: www.nyirkutato.hu



BURGONYA FAJTÁK


Rebeka

Tenyészideje e fajtának a keléstől az érésig 96-98 nap. A Kleopátra fajtánál 2-4 nappal hosszabb, a Rosara fajtával azonos. Primőr termesztésre nem ajánlható. Intenzív fejlődésű, „nyári burgonya”. Halványlila fehér cimpájú virágzata van. Gumója hosszúkas, hengeres, felszíne kiegyenlített. Héjszíne rózsaszín, sima. A rügök sekélyek, a gumók egyenletesen helyezkednek el. Hússzíne világos sárga, tetszetős.


Nem szétfővő típusú. Kiemelkedően jó tulajdonsága, hogy sütve és főzve kellemes ízű, jó étkezési minőségű. Konzisztenciája kissé szappanos. Gumója kifejezetten piacos. A gumók jól parásodnak, mechanikai sérülésre nem hajlamosak. Korai érése ellenére jól tárolható. Az öntözést meghálálja,

de száraz körülmények között is stabilan terem. Termőképessége 35-38 t/ha.

A levélsodró vírussal szemben jó szántóföldi rezisztenciája van, az X és Y vírussal szemben rezisztens. Lombfitymával szemben ellenálló, az alternáriás levélfoltosságra közepesen érzékeny. A gumóbetegségekre nem fogékony. A sugárgombás varasodással szemben toleráns. Tápanyagigénye kifejezett. A gumók mérete kiegyenlített, extra méretű gumókat nem nevel.



Rachel



Középkorai érésű burgonyafajta, tenyészideje és a fajta kezdeti intenzív fejlődése a Desirée fajtához hasonló. Lilás rózsaszín, fehér cimpájú virágai vannak. Gumója rövid, ovális, kiegyenlített felületű.

Magyarországon közkedvelt piros héjjal és fehér hússal rendelkezik.

Rügyei sekély elhelyezkedésűek, a gumón egyenletesen oszlanak el.

Levélsodródás vírussal (PLRV) szemben toleráns. Y vírus és komplexeivel szemben rezisztens.

Húsbetegségekre nem fogékony. Szántóföldön 3 évig lényeges leromlás nélkül szaporítható.


Termőképessége 35-40 t/ha. Nagy előnye, hogy öntözés nélküli termesztés mellett is biztonságosan terem. Gumója tetszetős.

Boglárka

Korai érésű fajta, tenyészideje a Kleopátránál 5-6 nappal hosszabb. Gumója hosszú-ovális alakú, rózsás héjú, húsa világos sárga. Konzisztenciája kissé lisztes, íze jó.

Kettős hasznosítású burgonyafajta **B** főzési típusú, étkezési és keményítőipari célra is alkalmas.

Levélsodródás vírussal (PLRV), valamint PVY vírus és komplexeivel szemben rezisztens. Lombfőftórával, sugárgombás varasodással, gombás és baktériumos gumórothadásokkal szemben mérsékelten rezisztens. Leromlásra nem hajlamos. Potenciális termőképessége 35-38 t/ha. Keményítő tartalma magasabb, mint egyéb korai érésű fajtáknak.



Paprikáskrumpli

Hozzávalók (30-35 személyre): 10 kg, 0,7-1 kg finom, húsos füstölt szalonna 10-15 fej vöröshagyma (mérettől függően), 5-7 zöldpaprika, 3-4 paradicsom, piros-paprika (kb. 5 evőkanállal), és só. A szalonnát apróra szeletelve pirítsuk meg kevés olajon, vagy sertésszíron, majd a zsíráján megfonnyasztjuk az apróra kockázott hagymát, amíg az üveges nem lesz. Ha kész, hozzáadjuk a feldarabolt paradicsomot és a feldarabolt zöldpaprikát, majd elkeverjük benne a piros-paprikát és néhány percnyi főzés után hozzáadjuk a megtisztított és csíkokra vágott burgonyát. Annyi vízzel kell felönteni, hogy ellepje. Ízesítjük kevés sóval, majd lassú tűzön főzzük készre. Főzés közben, ha még nem főtt meg a krumpli, de a leve nagyon elpárolgott, akkor kevés vizet lehet még hozzátenni.

Lapcsánka

Négy személyre kb. 1 kg burgonyát nyersen lereszelünk, sóval, borssal, fokhagymával ízesítünk, 1-2 tojást teszünk a masszához. Egy kicsit sűrűbb, mint a palacsinta tészta. Kanalként forró olajba tesszük, kissé meglapítjuk, és folyamatosan kisütjük.

Szilvásgombóc

Hozzávalók: , szilva (kockacukor), , porcukor, őrölt fahéj. A kimagozott szilvák közepébe tegyünk egy-egy kockacukrot, s egy kis őrölt fahéjat. A krumplitésztát kb. 1 cm vastagra kell kinyújtani, majd akkora négyzetekre kell vágni, hogy azokba egy-egy szilva beburkolható legyen. Minden téstadarab közepére tegyünk egy töltött szilvát, és lisztes kézzel formázzuk meg a gombócokat. Bő, lobogó, enyhén sós vízben főzzük ki, majd a gombócokat pirított zsemlemorzsába forgatjuk.

Frissen, porcukorral és fahéjjal meghintve tálaljuk.



Az **EURO SOL Kft** a német **EUROPLANT GmbH** nyolcvannál is több burgonya fajtát tartalmazó kínálatából nyolc, hazánkban is jól vizsgázott fajtát ajánl az érdeklődő termelők figyelmébe.

Az öt piros héjú és három sárga héjú fajta közös jellemzői: bő, vagy igen bő termés, egyenletes gumók, általában sima, nagyon sima héj, sekély rügygödrök, jó mechanikai tűrőképesség, jó tárolhatóság a korai fajtáknál is, piacos megjelenés, kitűnő moshatóság. Hámózás, illetve főzés utáni elszíneződés nincs, vagy minimális. Betegségekre ellenálló, főnalféreggel kapcsolatos rezisztenciájuk jó.

A korai éréscsoportba tartozó piros héjú **BELLAROSA**, **RED SONIA** mellett a szintén korai **MARABEL** és **ANUSCHKA** sárga héjú fajtákat ajánljuk.

Ajánlott középkorai fajtáink: **LAURA**, **RED FANTASY**, **VALERY**, mindhárom piros héjú, sötét sárga, sárga hússzínű.

A hosszú tenyészidejű, sárga hússzínű **JELLY** kifejezetten alkalmas a koptatásra.

Elérhetőségeink:

EURO SOL Kft

1203 Budapest, Vizisport út 21/A

Telefon/fax: +36 1 397 2519, +36 1 397 2520 Mobil: +36 30 400 6879, +36 30 933 3646

e-mail: eurosol@eurosol-potato.hu Web: www.eurosol-potato.hu

Ne feledjék:

**Az általunk kínált fajták az igényes termelők
sikeres és gazdaságos munkáját szolgálják!**

Anuschka

Igen korai érési csoportba tartozó, **A/B** főzési típusú, kiváló minőségű, jól tárolható burgonya. Gumója ovális alakú, közepesen nagyméretű, rügygödre nagyon sekélyek. Héja sárga színű, nagyon sima, hússzíne világos sárga. Igen bő termő.

Jó ízű, közepesen keményre fővő salátának is alkalmas burgonya. Főzés utáni elszíneződése nincs.

Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó.

Burgonya fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1).



Valery



Közép korai érési csoportba tartozó burgonyafajta, **A/B** főzési típusú, kiváló minőségű, jól tárolható étkezési burgonya. Gumója ovális, hosszúkas ovális alakú, rügygödre nagyon sekélyek. Héja sima, piros színű, hússzíne sárga. Bőtermő. Gumói egyenletesek, közepesen nagyobb méretűek, igen nagy arányban piacosak. Kitűnő ízű, keményre fővő saláta burgonya. Főzés utáni elszíneződése nincs. Jól mosható és csomagolható.

Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó. Burgonya fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1).

Bellarosa

Igen korai érési csoportba tartozó fajta, **B** főzési típusú, kiváló minőségű, jól tárolható közkedvelt étkezési burgonya. Lombja robosztus, gumója ovális alakú, igen nagyméretű, rügygödre közepesen mélyek. Héja piros színű, hússzíne világos sárga. Igen bő termő. Jó ízű, nem szétfővő, a korai piacok közkedvelt burgonyája. Főzés utáni elszíneződése jelentéktelen.

Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó. Burgonya fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, 4).



Jelly



Közép kései érési csoportba tartozó, **B** főzési típusú, kiváló minőségű, jól tárolható közkedvelt étkezési burgonya. Gumója ovális alakú, rügygödre nagyon sekélyek. Héja rendkívül sima, sárga színű, hússzíne világos sárga. Rendkívül bő termő. Gumói egyenletesek, közepesen nagyobb méretűek. Kitűnő ízű, nem szétfővő, koptatásra is kiválóan alkalmas étkezési burgonya. Főzés utáni elszíneződése jelentéktelen.

Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó. Burgonya – fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, Ro3-5).

BURGONYA FAJTÁK

Laura

Közép korai érési csoportba tartozó, **B** főzési típusú, kiváló minőségű, jól tárolható közkedvelt étkezési burgonya. Gumója ovális alakú, rügygödreire nagyon sekélyek. Héja sima, piros színű, hússzíne sötét sárga. Bőtermő. Gumói egyenletesek, igen nagy arányban piacosak. Kitűnő ízű, nem szétfővő asztali burgonya. Főzés utáni elszíneződése nincs. Jól mosható és csomagolható. Sencor gyomirtó szerre érzékeny, használata természsökkenést okozhat.

Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó.

Gumója az élettani elváltozásokra csak kis mértékben hajlamos.

Burgonya fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, 2, 3, 4, 5).



Marabel



Korai érési csoportba tartozó, **B** főzési típusú, kiváló minőségű, jól tárolható közkedvelt étkezési burgonya. Gumója ovális alakú, rügygödreire nagyon sekélyek. Héja igen sima, sárga színű, hússzíne világos sárga. Igen bőtermő. Gumói egyenletesek, közepesnél nagyobb méretűek, igen nagy arányban piacosak. Kitűnő ízű, nem szétfővő asztali burgonya. Főzés utáni elszíneződése nincs. Jól mosható és csomagolható, koptatásra kiválóan alkalmas. Mechanikai sérülések iránti hajlama gyenge, gépi betakaríthatósága kiemelkedően jó.

Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó. Burgonya fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, 4).

Red Fantasy

Közép korai érési csoportba tartozó, **B** főzési típusú, kiváló minőségű, jól tárolható közkedvelt étkezési burgonya. Gumója ovális, hosszúkas ovális alakú, rügygödreire nagyon sekélyek. Héja sima, piros színű, hússzíne sötét sárga. Bőtermő. Gumói egyenletesek, közepesnél nagyobb méretűek, igen nagy arányban piacosak. Kitűnő ízű, közepesen keményre fővő asztali burgonya. Főzés utáni elszíneződése nincs. Jól mosható és csomagolható. Sencor gyomirtó szerre közepesen érzékeny, állományban történő használata természsökkenést okozhat. Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó. Burgonya – fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, 4).



Red Sonia



Igen korai érési csoportba tartozó, **B** főzési típusú, kiváló minőségű, jól tárolható étkezési burgonya. Gumója ovális alakú, nagyméretű, rügygödreire sekélyek. Héja piros színű, hússzíne világos sárga. Igen bőtermő.

Jó ízű, nem szétfővő, a korai piacok közkedvelt burgonyája lehet.

Főzés utáni elszíneződése jelentéktelen.

Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó.

Burgonya-fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, 2, 3).



PANNÓNIA

Magyar nemesítésű fajta. Állami elismerése: 2005. Növényfajta-oltalom megadásának éve: 2007.

Tenyészideje: 98 nap. Tővenkénti átlagosan 15 db kiegyenlített étkezési méretű gumója szép küllemű, hosszú-ovális alakú, sima és sárga héjú, világos sárga húsú. Szárazanyag és keményítőtartalma közepes-magas. Keményítőtartalma a vizsgált 3 év átlagában: 15,1 %. Finom ízű, **B** főzési típusú – főzésre és sütésre egyaránt kiválóan alkalmas fajta. A súlyos leromlást okozó PLRV (Levélsodró vírus) és a PVY (Y vírus) vírusokkal szemben jó rezisztenciával rendelkezik, amely lehetővé teszi biztonságos szaporítását és jó minőségű vetőgumó előállítását Magyarországon is. Lombfitoftórával és sugárgombás varasodással szemben a standard Cleopátránál ellenállóbb. Burgonya rákkal (*Synchytrium endobioticum* D1) szemben rezisztens, fonálféregre fogékony. Kiemelkedő termőképessége, jó vírusrezisztenciája és alacsony szintű leromlása, továbbá többcélú felhasználási lehetősége és kitűnő íze a korai-nyári éréscsoport legértékesebb fajtájává teheti.

Humuszos homoktalajon, öntözött körülmények között termesztető legeredményesebben. Korai szabadföldi primőr (újkrumpli) termesztésnél (Június közepe-vege között szedve) 30-40 t/ha foszlóshéjú termésre képes. Nyári termesztésben (Július-Augusztus között betakarítva) 45-70 t/ha érett (parásodott héjú) termés is elérhető a fajtával. Július közepén ültetve őszre még 25-30 t/ha foszlóshéjú burgonya takarítható be. 1 hónappal korábbi (júniusi) ültetés esetén a 35-40 t/ha gumótermés parásítására is van lehetőség és ilyen esetben a fiatal, de étkezési méretű gumótermés (bébi burgonya) tárolható tavaszig is.



További információ: Dr. Kruppa József KRUPPA-MAG Kft.

4600 Kisvárd, Váralja út 22

Telefon: +36304524265; Fax: +3645506142

E-mail: kruppa19@t-online.hu; Web: www.kruppamag.hu

ILA

2009 Kft

ILA

Magyar nemesítésű fajta. Állami elismerése és növényfajta-oltalom megadásának éve: 2010.

Tenyészideje 98 nap. Rózsahéjú, világos sárga húsú, hosszú-ovális alakú, közép magas szárú burgonya. Jó étkezési minőségű, finom ízű, B főzési típusú, sütésre, főzésre és szulfítálásra kiválóan alkalmas. Rezisztens a PLRV (sodró vírus), PVY súlyos leromlást okozó és a PVA, PVX mozaik vírusok ellen, ami lehetővé teszi több éven át a felújítás nélküli biztonságos termesztését. Sugárgombás varasodással szemben kiemelkedően ellenálló. Hosszú nyugalmi idejű, jól tárolható. Magas fitoftóra ellenállósága lehetővé teszi a gombaölő szerek nélküli termesztését, felszívódó réz lombtrágya alkalmazása esetén a sárgulós lombvesztést okozó baktériummal szemben is ellenálló. Magas (18-22) kötőszám miatt 35-36000 tő/ha javasolt ültetni. Öntözött körülmények között termesztve 50-70 tonna hozamra képes.



További információ:

Osváth Zoltán: ILA 2009 Kft. 3925 Prügy, Csokonai V. M. út 39.

Telefon. +36202333065, +36304289905,

E-mail: osvathz@enternet.hu

Keszthelyi burgonyafajták

Hagyomány és Minőség

Próbálja ki - termeljen olcsóbban - gazdaságosabban -
versenyképesebben!

Balatoni róksa

Démon

Hépehely

White Lady

Góliát

Katica

Somogyi kifli

Rioja

Lorett

Magyar földbe termettek!

Tel/Fax: (83) 545-104

E-mail: rbk@georgikon.hu

Web: www.burgonyakutatas.hu



BURGONYA FAJTÁK

Balatoni rózsza

Tenyészdíó: Korai (~95 nap).

Gumójellemzők: Sötét rózsza héjú, nagyon szép ovális alakú, sárga húsú, nagy gumójú, sekélyen ülő rügyekkel.

Száranyag-tartalma közepes (19-20%).

Lombozat: Erős szárú, nagy, matt zöld levelekkel.

Termesztési és tárolási jellemzők:

Bőtermő, 8-10 db-os kötősszámmal. Korai tenyészideje ellenére hosszú nyugalmi idejű, jól tárolható.

Alaktartása és stressztűrő-képessége kiváló.

Hajtatásra, szabadföldi fóliás termesztésre

és nyári ültetésű burgonyatermesztésre is ajánlott.

Felhasználási érték: **B** főzési típusú, nem lisztes, finom hús szerkezetű fajta. Általános hasznosítási célú, elsősorban főtt típusú ételek készítésére alkalmas, kiváló ízű étkezési burgonya.

Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben magas rezisztenciával rendelkezik. Lombfitofitórával szemben közepesen fogékony. Gumóvarasodással, valamint a burgonya fonálféreg Ro1 és Ro4 rasszával szemben rezisztens. Burgonyarák rezisztens.

Sencor gyomirtó szerre (metribuzin) érzékeny, javasolt szermennyiség alapkezelésbe maximum 80, lombkezelésre 15-20 cm-es magasságig maximum 35 dkg/ha.



Katica



Tenyészdíó: Középkorai (~105 nap).

Gumójellemzők: Nagyon szép, fényes rózsza héjú, ovális alakú, sárga húsú, közepes gumóméretű, sekélyen ülő rügyekkel. Száranyag-tartalma közepes (19-20%).

Lombozat: Erős szárú, magas, közepes méretű, sötétzöld levelekkel.

Termesztési és tárolási jellemzők: Bőtermő, 14-16 db-os kötősszámmal. Kiváló alaktartó és stressztűrő képességű. Közepes nyugalmi idejű, jól tárolható. Kiváló árukihozatali arányú. Kiegyenlített, közepes gumómérete, valamint héjminősége miatt a kis kiszerelésű (2-5 kg-os),

mosott kicsomagolásra kimondottan alkalmas.

Felhasználási érték: **B** főzési típusú, nem lisztes, finom hús szerkezetű fajta. Általános hasznosítási célú, elsősorban főtt típusú ételek készítésére alkalmas, kiváló ízű étkezési burgonya.

Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben magas rezisztenciával rendelkezik. Lombfitofitórával szemben közepesen fogékony. Gumóvarasodással, valamint a burgonya fonálféreg Ro1 és Ro4 rasszával szemben rezisztens. Burgonyarák rezisztens.

Démon

Tenyészdíó: Középkorai (~110 nap).

Gumójellemzők: Nagyon szép ovális alakú, sötét rózsza héjú, sárga húsú, nagy méretű, sekélyen ülő rügyekkel. A rügyek sötétebb bordó színek, mint a héj. **Száranyag-tartalma** közepes (19-20%).

Lombozat: Erős szárú, magas, közepes méretű, sötétzöld levelekkel.


Termesztési és tárolási jellemzők: Bőtermő, kiegyenlített gumóméretű, hosszú nyugalmi idejű, könnyen tárolható fajta. Kiváló árú kihozatali aránnyal. Mosott kicsomagolásra is alkalmas.

Sencor gyomirtó szerre (metribuzin) érzékeny, javasolt szermennyiség alapkezelésbe maximum 80, lombkezelésre 15-20 cm-es magasságig maximum 35 dkg/ha.



Felhasználási érték: **B/C** főzési típusú, enyhén lisztes, finom hús szerkezetű fajta. Általános hasznosítási célú, kiváló ízű étkezési burgonya.

Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben magas szántóföldi rezisztenciával rendelkezik. Lombfítóftórával szemben közepesen fogékony. Gumóvarasodással, valamint a burgonya fonálféreg Ro1 és Ro4 rasszával szemben rezisztens. Burgonyarák rezisztens.



Hópehely



Tenyészedő: Középkorai (~110 nap).

Gumójellemzők: Halványrózsaszínbe hajló sárgás barna héjú, kerekded alakú, fehér húsú, nagy-középnagy gumójú, közepmélyen ülő rügyekkel. Szárazanyag-tartalma közepes (19-20 %).

Lombozat: Közepes méretű, kevés vastag szárral, középzöld, nagy levélkéekkel.

Termesztési és tárolási jellemzők: Bőtermő, rendkívüli termésstabilitású fajta. Korán nagy gumókat fejleszt, jó alaktartó, hosszú nyugalmi idejű, könnyen tárolható. Gumóit magasan köti, ezért mélyebb ültetést, és magasabb bakhátat igényel.

Felhasználási érték: **B/C** főzési típusú, enyhén lisztes, finom hús szerkezetű, kiváló ízű étkezési burgonya. Minden

típusú étel elkészítésére alkalmas (sült, főtt, püré és tészta).

Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben magas szántóföldi rezisztenciával rendelkezik. Lombfítóftórával szemben közepesen ellenálló.

Gumóvarasodással szemben és a burgonya fonálféreg Ro1 és Ro4 rasszával szemben rezisztens.

Rioja (Százszorszép)

Tenyészedő: Középkorai (~115 nap).

Gumójellemzők: Rózsa héjú, nagyon szép ovális alakú, világos sárga húsú, közepnagy gumójú, sekélyen ülő rügyekkel, formatartó. Szárazanyag-tartalma magas (22-23%).

Lombozat: Erős szárú, magas, nagy, fénylő, világos zöld levelekkel.

Termesztési és tárolási jellemzők: Bőtermő, hosszú nyugalmi idejű, jól tárolható. Alaktartása és stressztűrőképessége révén kiváló áru kihozatali aránnyal rendelkezik. Kicsomagolásra kiválóan alkalmas.

Felhasználási érték: **C** főzési típusú, könnyen fővő, finom hús szerkezetű, lisztes fajta. Kiválóan alkalmas héjában való sütésre, hasábburgonya, püré és tésztafélék készítésére.

Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben magas szántóföldi rezisztenciával rendelkezik.

Lombfítóftórával szemben közepesen ellenálló.

Gumóvarasodással szemben rezisztens.





BURGONYA FAJTÁK

Góliát

Tenyészeitő: Középkorai (~105 nap).

Gumójellemzők: Rózsahéjú, ovális alakú, sárgahúsú, nagyméretű, középnyúlású ültő rügyekkel. Szárazanyag-tartalma közepes (18-20 %).


Lombozat: Erős, felálló szárú, ovális, közepes méretű levélkékkel.

Termesztési és tárolási jellemzők: Bőtermő, közepes nyugalmi idejű, hajtatott termesztésre is alkalmas fajta. Gumói még nagy méret esetén is mentesek a legfontosabb hibáktól (üregesedés, alak deformáció, repedés).


Felhasználási érték: **B** főzési típusú, nem szétfővő, de nem „vizes”, jó ízű étkezési burgonya. Elsősorban főtt ételek készítésére alkalmas.

Rezisztenciák: Immunis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben magas szántóföldi rezisztenciával rendelkezik.

Lombfőftőrával szemben közepesen ellenálló. Gumóvarasodással szemben rezisztens.



Lorett



Tenyészeitő: Középkorai (~115 nap).

Gumójellemzők: Világos rózsahéjú, ovális alakú, világos sárga húsú, nagyméretű, sekélyen ültő, bíbor színű rügyekkel. Szárazanyag-tartalma közepes (17-19 %).

Lombozat: Erős szárú, nagy lombú, ovális, középnyúlású levélkékkel.

Termesztési és tárolási jellemzők: Rendkívül bőtermő, hosszú nyugalmi idejű, jól tárolható, stabil fajta. Finom héjszerkezete, és nagyméretű gumói miatt kíméletes betakarítást, és áru előkészítést igényel. Hajtatott főliás, és szabadföldi termesztésre is alkalmas.

Felhasználási érték: **B** főzési típusú, markáns burgonya ízű, nem szétfővő, általános célú étkezési burgonya. Elsősorban főtt típusú ételek elkészítésére alkalmas étkezési burgonya.

Rezisztenciák: Immunis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben magas szántóföldi rezisztenciával rendelkezik. Lomb- és gumófőftőrával szemben fogékony. Gumóvarasodásra kissé fogékony.



White Lady

Tenyészeitő: Középkorai (~120 nap).

Gumójellemzők: Kerek-ovál alakú, középnagy, világos sárga héjú és húsu, sekélyen ülő rügyekkel. Szárazanyag-tartalma magas (20-21 %).


Lombozat: Közepesen erős szárú, nem pigmentált, világos zöld, nagy levélkéekkel.

Termesztési és tárolási jellemzők:

Bőtermő, hosszú nyugalmi idejű, jól tárolható, rezisztenciátulajdonságai révén organikus termesztésre is alkalmas fajta.

Felhasználási érték: C főzési típusú, enyhén lisztes, finom hús szerkezetű étkezési burgonya. Kiváló ízű, alkalmas héjában való sütésre, hasábburgonya és püré készítésére.

Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal, valamint a lomb és gumófitofórával szemben magas rezisztenciával rendelkezik. Gumóvarasodással és a burgonya fonálféreg Ro1 és Ro4 rasszával szemben rezisztens. Organikus, vagy biotermesztésre is javasolható fajta.



Somogyi kifli

Tenyészeitő: Középkorai (~110 nap).

Gumójellemzők: Kifli alakú, középnagy, sárga héjú és húsu, közepmélyen ülő rügyekkel. Szárazanyag-tartalma közepes (17-19 %).

Lombozat: Középmagas szárú, kis méretű, középzöld levélkéekkel.


Termesztési és tárolási jellemzők:

Közepes termőképességű, termesztése és feldolgozása alakja miatt nehezen gépesíthető. Nyugalmi ideje rövid, ennek ellenére jól tárolható, a tárolási betegségekkel szemben ellenálló. Öntözésses termesztést igényel.

Felhasználási érték:

A főzési típusú, kemény húsu, kiváló étkezési minőségű, és ízű, elsősorban salátaburgonya.

Rezisztenciák: Vírusbetegségekre, lombfitofórára és alternáriára fogékony. Gumóvarasodással szemben ellenálló.





A HZPC Holland B. V. 1999-ben jött létre, a Hettema és a De ZPC, Hollandia két legmeghatározóbb vetőburgonya-exportáló cégének együttműködéséről hozott döntést követően. A HZPC fő tevékenységi köre vetőburgonya nemesítése, termesztése és értékesítése. A HZPC a világ egyik legnagyobb vetőburgonya-kereskedelmi vállalkozása. A HZPC csoportnak 215 munkatársa van, közülünk 135-en Hollandiában dolgoznak. Munkatársaink, valamint nemesítőink és termesztőink képezik összességében a cég részvényeseit.

A HZPC öt erőssége a következő:

Nemesítés, Kutatás és Fejlesztés • Termelés
Értékesítés és Marketing • Logisztika
Támogatás és Népszerűsítés

Burgonya fajtáink:

ADORA • ANNABELLE • ASTERIX • CANBERRA
CECILE • CICERO • CLEOPATRA • COURAGE
DESIREE • MOZART • RED SCARLETT • RONALDO
SALINE • SYLVANA • VOLUMIA



HZPC magyarországi képviselője:

Wendler István Kft.


Iroda 1073 Budapest, Erzsébet krt. 2. II. 14/b
Levélcím: 1398 Budapest 62, Pf. 586.
Telefon: +36(1)352-5204
Fax : +36(1)352-5205
Mobil: +36(30)990-0002
E-mail: istvan.wendler@hzpc.hu
Honlap: www.hzpc.hu

ADORA /Primura x Alcmaria/

Felhasználási cél:	primőr és hagyományos piacra.
Érésidő:	nagyon korai.
Gumó alakja:	kerekded-ovális.
Gumó mérete:	nagyon nagy gumók.
Héj színe:	világos sárga.
Hús színe:	világos sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek e.l
Szárazanyagtartalma:	18,5%.
Főzési típusa:	A/B = kemény/viaszos.
Főzés utáni elszíneződése:	Nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4 típussal szemben.
Burgonyarák:	fogékony.
Lombfitoftóra:	fogékony.
Gumófitoftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	elfogadhatóan fogékony.



ANNABELLE /Nicola x Monalisa/



Felhasználási cél:	saláta és hagyományos piacra.
Érésidő:	középkorai.
Gumó alakja:	hosszú-ovális.
Gumó mérete:	közepes gumók.
Héj színe:	sárga.
Hús színe:	sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	18,4%.
Főzési típusa:	A = kemény/saláta.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	nagyon rövid.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4 típussal szemben.
Burgonyarák:	ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra:	fogékony.
Gumófitoftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	közepesen fogékony.



ASTERIX /Cardinal x SUP Ve 70-9/

Felhasználási cél:	kiválóan alkalmas hasábburgonyának és frissáru piacra.
Érésidő:	középkésői.
Gumó alakja:	hosszúak.
Gumó mérete:	nagyméretű gumók.
Héj színe:	vörös.
Hús színe:	világos sárga.
Szemek mélysége:	középmélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	22,9%.
Főzési típusa:	B = viaszos.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	rövid.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4
Burgonyarák:	ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra:	fogékony.
Gumófitoftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	kevésbé fogékony.



CANBERRA



Felhasználási cél:	primőr és frissáru piacra.
Érésidő:	középkorai.
Gumó alakja:	ovális.
Gumó mérete:	középnagy- nagyméretű gumók.
Héj színe:	vörös.
Hús színe:	sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	20,5%.
Főzési típusa:	A = kemény/saláta.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,2,3,4
Burgonyarák:	ellenálló az 1,2 és 6 típussal szemben.
Lombfitoftóra:	fogékony.
Gumófitoftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	közepesenál jobban ellenálló.

CECILE /Nicola x RZ 88-404/

Felhasználási cél:	saláta és hagyományos piacra.
Érésidő:	középkésői.
Gumó alakja:	hosszú.
Gumó mérete:	közepes gumók.
Héj színe:	sötét vörös.
Hús színe:	sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	20,1%.
Főzési típusa:	A = kemény/saláta.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	nagyon rövid.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,2,3,4
:	típussal szemben.
Burgonyarák:	ellenálló az 1 és 2
:	típussal szemben.
Lombfitóftóra:	fogékony.
Gumófitóftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	közepesnél jobb ellenálló.



CICERO /Ceb. 73-147-153 x Morene/



Felhasználási cél:	mosva, előcsomagolva a frissáru
:	piacra, elsősorban szupermarketek,
:	üzletláncok részére.
Érésidő:	középkorai.
Gumó alakja:	ovális.
Gumó mérete:	középnagy- nagyméretű gumók.
Héj színe:	sárga.
Hús színe:	világos sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	20%.
Főzési típusa:	B = viaszos.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló Ro 1,4 típussal
:	szemben.
Burgonyarák:	fogékony.
Lombfitóftóra:	közepesen fogékony.
Gumófitóftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	közepesen fogékony.



CLEOPATRA /ZPC 50-35 x Desiree/

Felhasználási cél:	primőr és hagyományos piacra.
Érésidő:	korai.
Gumó alakja:	Ovális.
Gumó mérete:	nagyméretű gumók.
Héj színe:	vörös.
Hús színe:	világos sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	20,2%.
Főzési típusa:	B = viaszos.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú.
Fonálféreg rezisztencia:	fogékony.
Burgonyarák:	fogékony.
Lombfitóftóra:	fogékony.
Gumófitóftóra:	fogékony.
Közönséges varasodás:	elfogadhatóan fogékony.



COURAGE /Lady Rosetta x HZ 81 h202/



Felhasználási cél:	kiváló chips burgonyának.
Érésidő:	középkorai.
Gumó alakja:	kerek.
Gumó mérete:	középnagy- nagyméretű gumók.
Héj színe:	vörös.
Hús színe:	világos sárga.
Szemek mélysége:	középmélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	23,4%.
Főzési típusa:	B/C .
Főzés utáni elszíneződése:	kissé színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4 típussal szemben.
Burgonyarák:	ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitóftóra:	fogékony.
Gumófitóftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	közepesen fogékony.

DESIREE /Urgenta x Depesche/

Felhasználási cél:	frissáru és hagyományos
:	piacra.
Érésidő:	középkésői.
Gumó alakja:	ovális.
Gumó mérete:	nagyméretű gumók.
Héj színe:	vörös.
Hús színe:	világos sárga.
Szemek mélysége:	középmélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	21,4%.
Főzési típusa:	B = viaszos.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú
Fonálféreg rezisztencia:	fogékony.
Burgonyarák:	ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra:	közepesen fogékony.
Gumófitoftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	elfogadhatóan fogékony.



MOZART /Redstar x Caesar/




Felhasználási cél:	mosva, előcsomagolva a frissáru
:	piacra, elsősorban szupermarketek,
:	üzletláncok részére.
Érésidő:	középkésői.
Gumó alakja:	ovális.
Gumó mérete:	középnagy- nagyméretű gumók.
Héj színe:	vörös.
Hús színe:	sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	20,3%.
Főzési típusa:	A/B = kemény/viaszos.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4 típussal
:	szemben.
Burgonyarák:	ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra:	fogékony.
Gumófitoftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	közepesenél jobban ellenálló.




RED SCARLETT /ZPC 80 0239 x MGB 78-286/

Felhasználási cél:	primőr és frissáru piacra.
Érésidő:	korai.
Gumó alakja:	ovális.
Gumó mérete:	középnagy- nagyméretű gumók.
Héj színe:	vörös.
Hús színe:	sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	18,6%.
Főzési típusa:	A/B = kemény/viaszos.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4 típusal szemben.
Burgonyarák:	ellenálló az 1 típusal szemben.
Lombfitóftóra:	fogékony.
Gumófitóftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	közepesen fogékony.




RONALDO /Red Pontiac x RZ-84-67/



Felhasználási cél:	hagyományos piacra.
Érésidő:	közép késői.
Gumó alakja:	ovális.
Gumó mérete:	nagyméretűek.
Héj színe:	mély-rózsaszín.
Hús színe:	világos sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	18,1%.
Főzési típusa:	A/B = kissé kemény.
Főzés utáni elszíneződés:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4 típusal szemben,
Burgonyarák:	ellenálló az 1,2,6 típusal szemben,
Lombfitóftóra:	fogékony a 18 típusra.
Gumófitóftóra:	fogékony.
Közönséges varasodás:	nagyon fogékony.

SALINE /Agria x Gallia/

Felhasználási cél:	primőr és mosva,
:	előcsomagolva a frissáru
:	piacra, elsősorban szupermar-
:	ketek, üzletláncok részére.
Érésidő:	korai.
Gumó alakja:	ovális/hosszú-ovális.
Gumó mérete:	nagyméretűek.
Héj színe:	sárga.
Hús színe:	sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	20,0%.
Főzési típusa:	B = viaszos.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	közepes.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4
:	típussal szemben,
:	kicsit fogékony az Ro 2,3
:	típusra,
:	fogékony az Ro 5 típusra.
Burgonyarák:	ellenálló a fysio 1 típussal szemben,
:	fogékony a fysio 2 típusra.
Lombfitoftóra:	nagyon fogékony.
Gumófitoftóra:	ellenálló.
Közönséges varasodás:	kicsit fogékony.



SYLVANA /Fabula x Xantia/



Felhasználási cél:	frissáru és hagyományos piacra.
Érésidő:	középkorai.
Gumó alakja:	Kerekded-ovális.
Gumó mérete:	nagyméretűek.
Héj színe:	sárga.
Hús színe:	sárga.
Szemek mélysége:	sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma:	19,7%.
Főzési típusa:	B = viaszos.
Főzés utáni elszíneződése:	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	hosszú.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4 típussal
:	szemben,
:	kicsit fogékony a Pa 2 típusra,
:	fogékony az Ro 2,3,5 és Pa 3 típusra.
Burgonyarák:	ellenálló a fysio 1 típussal szemben,
:	fogékony a fysio 2 típusra.
Lombfitoftóra:	fogékony.
Gumófitoftóra:	közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás:	közepesen fogékony.



VOLUMIA /Mondial x Adora/

Felhasználási cél:	primőr és frissáru piacra.
Érésidő:	korai.
Gumó alakja:	ovális.
Gumó mérete:	nagyméretűek.
Héj színe:	sárga.
Hús színe:	világos sárga.
Szemek mélysége:	közép mélyen helyezkednek el.
Száranyagtartalma:	28,6%.
Főzési típusa:	A/B = kemény/viaszos.
Főzés utáni elszíneződése	nem színeződik el.
Nyugalmi periódusa:	meglehetősen rövid.
Fonálféreg rezisztencia:	ellenálló az Ro 1,4 típussal szemben,
:	kicsit fogékony az Ro 2,3 típusra,
:	fogékony az Ro 5 típusra.
Burgonyarák:	ellenálló a fysisio 1,2 típussal szemben.
:	
Lombfitóftóra:	fogékony.
Gumófitóftóra:	Jó ellenálló.
Közönséges varasodás:	kicsit fogékony.



Krumplival gyúrt tészta

1 kg krumplihoz veszünk 25 dkg lisztet, 1 tojást, egy csapott evőkanálnyi zsírt (vagy vaját) és egy kevés sót. A krumplit meghámozzuk, és még forrón áttörjük. Ha kihűlt, összedolgozzuk a liszttel, a tojással, a zsírral (vagy olvasztott vajjal) és megsózzuk. A masszát jól összegyúrjuk, a végén egyenletesnek és kissé ruganyosnak kell lennie.

Nudli

A krumplit sós vízben megfőzzük, még forrón átnyomjuk. Ha kihűlt, liszttel, egy tojással jól összegyúrjuk. Kinyújtjuk, és kb. fél diónyi tésztából sodorjuk a nudlikat.. Lobogó sós vízbe dobjuk, s ha feljön a víz tetejére, lehet kiszedni és pirított zsemlemorzzában megforgatni.

: A zsemlemorzsa helyett cukros mákkal is kiváló eledel.

Héjában sült burgonya forró, darált tepertővel

Személyenként 4-6 burgonyát jól megmosunk, és héjastól megsütjük. Amikor elkészült, a forró krumplikat egy konyharuhába csavarjuk, hogy könnyebben tisztíthassuk. Közben a darált tepertőt megforrósítjuk és a megtisztított krumplira locsoljuk. Savanyú uborkával, nyáron kovászos uborkával, savanyú káposztával, vékonyra szeletelt vöröshagymával fenséges téli (nyári) reggeli, de vacsora is lehet boros, vagy rumos teával.